

Este 10 % din populație cu adevărat homosexuală?

Cifra de 10 % a început ca o denaturare a studiilor făcute în anii 1940 de Alfred Kinsey și de asociații săi. Kinsey a raportat că 37 % dintre bărbații din studiile sale au avut cel puțin o întâlnire homosexuală care a dus la orgasm. Și a sugerat că aceste cifre erau subestimate – că procentul real era chiar mai mare. Organizațiile pro-gay au dedus cifra de 10 % din rapoartele lui, dorind un procent destul de mare pentru a fi folosit în mișcarea de lobby a drepturilor civile, dar nu prea mare pentru a fi de necrezut.

Studii mai recente în diferite țări din lume, făcute de institute de cercetare și de universități, au arătat în mod logic că mai puțin de 3 % și posibil că mai puțin de 2 % dintre bărbați sunt activi homosexual, într-un an dat. Probabil că mai puțin de 5 % din populația masculină adultă se angajează într-o practică susținută a homosexualității, într-o perioadă semnificativă a vieții adulte. Homosexualitatea feminină este estimată a fi aproximativ jumătate sau mai mică decât procentele masculine, și pare să caracterizeze mai puțin de 2 % din populația feminină. Aceasta înseamnă că pretenția unui procent de 10 % este o denaturare.

Iată o listă a câtorva studii...

1. Un studiu făcut pe 5514 studenți canadieni la colegiu și universitate, cu vârsta sub 25 de ani, a găsit că 1 % erau homosexuali și 1 % erau bisexuali. Studiu făcut de King și alții (1988). Canada, studiul Tinerii și SIDA. Kingston, ON: Universitatea Oxford.
2. Un studiu făcut pe 8337 de bărbați britanici a găsit că 6,1 % avuseseră „o experiență homosexuală” și că 3,6 % au avut mai mult de un partener homosexual. Studiu de Johnson, A. M. și alții (1992). Stiluri de viață sexuală și riscul HIV. *Nature*, 360(3), 3 dec. 1992, 410-421.
3. Un studiu francez pe 20055 de oameni a găsit că 4,1 % dintre bărbați și 2,6 % dintre femei au avut cel puțin un contact sexual cu o persoană de același sex, în viața lor. Studiu de ANRS: Agenția Națională de Cercetări asupra Cercetătorilor SIDA (1992). SIDA și comportamentul sexual în Franța. *Nature*, 360(3), 3 dec. 1992, 407-409.
4. Un sondaj aleatoriu danez a găsit că 2,7 % din 1373 de bărbați care au răspuns la chestionar, aveau experiență homosexuală (contact sexual). Studiu de Melbye, M. & Biggar, R.J. (1992). Interacțiuni între persoane cu risc pentru SIDA și populația generală în Danemarca. *Jurnalul American de Epidemiologie*, 135(6), 593-602.
5. Sondajul Interviu pentru Sănătate Națională ia interviuri familiilor populației civile neinstituționalizate. Rezultatele a trei dintre aceste sondaje, făcute în 1990-1991 și bazate pe mai mult de 9000 de răspunsuri de fiecare dată, au găsit că între 2-3 % dintre oamenii care au răspuns, au spus da la un set de afirmații care includeau „Ești un bărbat care a făcut sex cu un alt bărbat cândva după 1977, chiar și numai o dată”. Studiu de Dawson, D. & Hardy, A.M. (1990-1992). Centrul Național pentru Statistica Sănătății, Centre pentru Controlul Bolii, Prezentare de date, 204, 1990-1992.
6. Într-un sondaj aleatoriu pe 600 de norvegieni, 3,5 % dintre bărbați și 3 % dintre femei au raportat că avuseseră o experiență homosexuală cândva în viața lor. Studiu de Sundet, J.M. și alții. Răspândirea comportamentului sexual riscant în populația generală a Norvegiei. În *Impactul global al SIDA*, editat de Alan F. Fleming și alții (New York: Alan R. Liss, 1988), 53-60.
7. Un sondaj național al bărbaților americani a găsit că 1,1 % erau implicați în activitate sexuală exclusiv cu același sex de-a lungul perioadei de 10 ani a studiului. Studiu de John Billy și alții. *Comportamentul Sexual al Bărbaților în Statele Unite, Perspective de Planificare a Familiei 25* (1993).
8. Un alt studiu al bărbaților americani a găsit că între 1,6 și 2 % luaseră parte la o activitate sexuală oarecare cu persoane de același sex în ultimul an, și că 3,3 % luaseră parte ocazional sau destul de des la maturitate. Studiu de Robert Fay și alții. Răspândirea și modele ale contactului sexual printre bărbați, *Science* 243 (1989).
9. Un al treilea studiu al bărbaților din SUA a găsit că 2,7 % luaseră parte la sex cu persoane de același sex în ultimul an, 4,1 % în ultimii 5 ani și 4,9 % de la vârsta de 18 ani. Studiu de Edward Lauman și alții. *Organizația Socială a Sexualității: Practici sexuale în SUA*, 1994.

articole

10. Un studiu al bărbaților din SUA, Regatul Unit și Franța a găsit că 0,82 % (SUA), 1,15 % (Regatul Unit) și 0,72 % (Franța) dintre bărbați au făcut sex exclusiv cu persoane de același sex într-o perioadă de 5 ani. Studiu de Randall Sell și alții. Răspândirea comportamentului și atracției homosexuale în Statele Unite, Regatul Unit și Franța. Rezultate ale eșantioanelor bazate pe populația națională, Arhive ale comportamentului sexual 24 (1995).
11. Patru studii pe bărbați americani de-a lungul unei perioade de 20 de ani, a găsit că frecvența unei oarecare activități sexuale cu același sex printre bărbați, în ultimele 12 luni, era de cel puțin 1,9 %, 1,2 %, 2,4 % și respectiv 2,0 %. Studii de Susan Rogers și Charles Turner. Contactul sexual masculin în SUA: constatări din cinci sondaje model, 1970-1990. Jurnalul cercetării sexuale 28 (1991).

Este homosexualitatea în primul rând o problemă nord americană?

Nu. Mulți oameni din locuri ca Africa, America Latină, India și China sunt afectați de homosexualitate, la fel ca în America de Nord. De fapt, din moment ce populația din Orientul Îndepărtat este mult mai mare decât populația din Occident, și 2-3 % din populația din Orientul Îndepărtat este de asemenea afectată de homosexualitate, un număr mult mai mare de oameni din Orientul Îndepărtat sunt afectați, decât în America de Nord.